

—  —

LA GAMMA COMPLETA CHE GARANTISCE
LA SALUTE DEI VOSTRI ALVEARI



 **CALIER**

CALISTRIP® BIOX

La striscia + logica

COME E QUANDO UTILIZZARE CALISTRIP® BIOX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto

Acaricida specificamente ideato per il **controllo delle infestazioni da Varroa**, sia in apicoltura **convenzionale che biologica**.

Formato

Buste da **10 strisce di acido ossalico** che **agiscono per contatto diretto**, garantendo un **effetto prolungato**.

Dosaggio

2 strisce per alveare e trattamento.

Indicazioni

Tutto l'anno, specialmente da febbraio a ottobre, in base alla zona climatica.

Trattamento

Durata di **6 settimane**.
Si possono eseguire **trattamenti successivi in caso di reinfestazione**, rispettando un intervallo di 1 mese tra un trattamento e l'altro.

Tempi di attesa

0 giorni di tempo di attesa nel miele e nella cera.

Efficacia

Efficacia **paragonabile a un trattamento di sintesi chimica** quando affettuato in assenza di covata.

Posizione A Per Dadant e Layens



Le strisce devono sempre essere posizionate nella camera di covata, aderente ai telaini, perché agiscono per contatto diretto. In questo modo il contenuto può essere prelevato dalle api durante le abituali operazioni di pulizia, favorendo il contatto con il principio attivo (acido ossalico)



Dadant

Layens

Langstroth

Calistrip® Biox 6,44 g strisce per alveare, si adatta a **tutti i tipi di alveare** grazie al suo dispositivo con doppio aggancio a due posizioni.

Per usare il prodotto occorre estrarre le strisce dalla busta, rimuovere la pellicola di plastica che le ricopre tirando il lembo e aprire le alette scegliendo la posizione più adeguata per l'alveare.

Posizione B Per Langstroth



APITRAZ®

La striscia vantaggiosa

LA COMBINAZIONE PERFETTA CONTRO LA VARROA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto

Acaricida a base di Amitraz, particolarmente **indicato per il controllo della Varroa**

Dosaggio

2 strisce per alveare e trattamento.

Formato

10 strisce di plastica di ampia superficie che consentono un rilascio efficiente del principio attivo

Efficacia

Dimostrata un'efficacia del **98%** (striscia di amitraz)

Riferimenti:
- Dott. Sánchez Escudero, Fernández Tejedor, T., Calatayud Tortosa, F., Zabalgogezcoa, I., Sánchez Martín, M. J. (2016). Lotta contro la Varroa in alveari Layens.
- Babiano Serrano, J.A. (2015). Rapporto di studio sull'efficacia di Apitraz in 10 alveari tipo Layens (Badajoz).
- Casas Ramos, B. Studio di Efficacia di un prodotto basato su dell'amitraz come trattamento contro la varroa. Apicoltura Iberica. Italiano: 2013;4:24-29.

Tempi di attesa

0 giorni di tempo di attesa nel miele



STRISCIE ADATTE PER OGNI TIPO DI ARNIA



Striscia corta (25 cm di lunghezza):
Adatta alle arnie **Langstroth**



Striscia lunga (30 cm di lunghezza):
Adatta alle arnie **Layens** e **Dadant**

Periodo di validità 18 mesi senza ricetta

PERCHE' COMBINARE CALISTIP® BIOX E APITRAZ®?

Linea guida

La linea guida consigliata per il trattamento degli alveari prevede un'applicazione di **Calistrip® Biox** in primavera o in estate combinata ad una applicazione di **Apitraz®** in autunno o in inverno.



Residui e resistenze

Calistrip® Biox non lascia residui né nel miele né nella cera, evita la comparsa di resistenze e consente il riposo e la rotazione necessaria con **Apitraz®**.



Combinazione

La **combinazione dei due prodotti** permette di **arrivare al di sotto della soglia dei danni provocati dall'infestazione**. In ogni modo, si consiglia di effettuare un test per decidere se effettuare un altro trattamento a inizio primavera o estate.



Infestazione

È importante ricordare che **il raggiungimento di livelli ottimali di infestazione** consente di mantenere **l'equilibrio fisiologico dello sciame** e pertanto, la sua continuità e produttività.



PROMOTOR L[®] Apis

Il miglior complemento nutrizionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto

Mangime complementare in forma liquida con un'alta composizione di vitamine e aminoacidi. Sostituto del polline per migliorare l'alimentazione delle api

Indicazioni

Tutto l'anno, soprattutto nei mesi autunnali, per garantire una riserva di proteine e vitamine durante l'inverno.



Dosaggio

Somministrare in soluzione zuccherina per 1,5 - 2 mesi.
5ml/L per le prime 3 settimane, poi 4 ml/L per il mantenimento.
Api regine: 7ml/L

Formato

Flacone da 1 L e tanica da 5 L

Benefici

- Agisce come sostituto del polline in periodi di carenza, siccità o condizioni metereologiche avverse.
- Aumenta i parametri produttivi delle api.
- Stimola la deposizione della regina e lo sviluppo della covata.
- Stimola l'alveare prima della fioritura principale.
- Migliora la produttività dell'alveare: promuove lo sviluppo precoce della camera di covata, aumenta il nucleo e aumenta la produzione di miele.
- Favorisce la ripresa della attività dell'alveare dopo l'inverno, prima della fioritura principale.
- Stimola la covata della regina e lo sviluppo della prole.
- Agisce come sostituto del polline nei periodi di carenza, siccità o condizioni metereologiche avverse.
- Indicato in autunno per assicurare alle api che sverneranno, una riserva di proteine e vitamine.



info@calier.it
farmacovigilanza@calier.it
www.calier.com
tel: (+39) 3319744978

Le presenti informazioni sono riservate ai medici veterinari e farmacisti

